

**LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH: JURNAL ILMIAH**

Judul Artikel : Efek Xilooligosakarida (XOS) dalam Mencegah Diabetes Mellitus Tipe 2
 Jumlah Penulis : 2 orang
 Status Pengusul : ~~Penulis Utama~~/~~Penulis Pertama~~/~~Penulis Korespondensi~~/~~Penulis pendamping~~
 Identitas Jurnal :
 a. Nama Jurnal : Pharmaceutical Sciences and Research (PSR)
 b. Nomor ISSN : e-ISSN 2477-0612
 c. Vol, No, Bln, Thn : Vol 6/No 3, Juli 2019
 d. Penerbit : Universitas Indonesia
 e. Jumlah halaman : 179-182 (4 halaman)

Kategori Publikasi Jurnal Ilmiah
(beri ✓ pada kategori yang tepat)

<input type="checkbox"/>	Jurnal Ilmiah Internasional
<input checked="" type="checkbox"/>	Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi
<input type="checkbox"/>	Jurnal Ilmiah Nasional Tidak Terakreditasi
<input type="checkbox"/>	Jurnal Ilmiah Nasional Terindeks DOAJ/lainnya

I. Hasil Penilaian Validasi


No.	Aspek	Uraian/Komentar Penilaian
1.	Indikasi Plagiasi	Tidak terdapat indikasi plagiasi. Hasil analisis plagiasi menunjukkan kesamaan sebesar 23% dan kesamaan tersebut banyak terdapat pada daftar pustaka (format).
2.	Linieritas	Artikel ini memiliki linieritas dengan bidang ilmu dan keahlian penulis

II. Hasil Penilaian Peer Review :

Komponen Yang Dinilai	Nilai Maksimal Jurnal Ilmiah					Nilai Akhir Yang Diperoleh
	Internasional Bereputasi	Internasional	Nasional Terakreditasi	Nasional Tidak Terakreditasi	Nasional Terindeks DOAJ dll	
Kelengkapan dan kesesuaian unsur isi jurnal (10%)			2,5			2,45
Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)			7,5			7,45
Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi (30%)			7,5			7,35
Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit (30%)			7,5			7,45
Total = (100%)			25			24,7
Kontribusi pengusul: Penulis Pendamping = $24,7 \times 40\% = 9,88$ (nilai akhir yang diperoleh pengusul)						
Komentar/ Ulasan Peer Review						
Kelengkapan kesesuaian unsur	Unsur yang dimiliki oleh artikel sudah lengkap dan memenuhi sebagai artikel ilmiah nasional terakreditasi					

Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan	Ruang lingkup dan pembahasan yang ditulis sudah cukup untuk menjelaskan proses yang terjadi pada penelitian (artikel) tersebut.
Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi	Data/informasi dan metodologi cukup mutakhir. Hal ini dapat dilihat dari sebagian besar pustaka yang digunakan adalah baru (kurang dari 5 tahun).
Kelengkapan unsur dan kualitas Penerbit	Penerbit merupakan jurnal nasional terakreditasi Sinta 2

Penilai 1



Dr. Muhammad Alfarabi

NIDN : 0304068602
 Unit kerja : Universitas Kristen Indonesia
 Bidang Ilmu : Biomedik
 Jabatan akademik (KUM) : Lektor (300)
 Pendidikan terakhir : S3

Efek Xilooligosakarida (XOS) dalam Mencegah Diabetes Mellitus Tipe 2

by Hanifah Rahmi

Submission date: 24-Aug-2021 03:19PM (UTC+0500)

Submission ID: 1635234180

File name: k_Xilooligosakarida_XOS_dalam_Mencegah_Diabetes_Mellitus_Tip.pdf (259.03K)

Word count: 2405

Character count: 14042

Efek Xilooligosakarida (XOS) dalam Mencegah Diabetes Mellitus Tipe 2

Effects of Xylo-oligosaccharide (XOS) in Preventing Type 2 Diabetes Mellitus

Lusi Putri Dwita*, Hanifah Rahmi

Faculty of Pharmacy and Science, Universitas Muhammadiyah Prof. DR HAMKA, Jakarta, Indonesia

ABSTRAK

Diabetes mellitus tipe 2 (DMT2) termasuk salah satu penyakit penyebab kematian yang tinggi di Indonesia. Intervensi dini sangat penting untuk menunda perkembangan penyakit ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efek pemberian prebiotik XOS (Xilooligosakarida) dalam mencegah resistensi insulin. Hewan coba dibagi menjadi 5 kelompok yang masing-masing diberikan XOS 2 gr/kg, XOS 1 gr/kg, XOS 0.5 gr/kg, kontrol diabetes, dan kontrol non-diabetes. Hewan diberikan zat uji dan pakan standar selama 2 minggu, kemudian diinduksi dengan STZ (streptozotocin) kecuali kontrol non-diabetes. Pada hari ke-19 dilakukan pengambilan data gula darah dan kolesterol total. Hasil penelitian menunjukkan pemberian XOS 2 gr/kg bb dapat mencegah kenaikan gula darah tertinggi (57.84 %) dan menunjukkan kadar kolesterol yang sebanding terhadap kontrol normal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian XOS dapat memberikan efek signifikan dalam mencegah DMT2.

Kata kunci: XOS; prebiotik; DMT2

ABSTRACT

Type 2 diabetes mellitus (T2DM) is one of the leading causes of death in Indonesia. Early intervention is very important to delay the development of this disease. This study aimed to determine the effect of XOS (Xylo-oligosaccharide) as prebiotic in preventing insulin resistance. The rats were divided into 5 groups: XOS 2 gr/kg, XOS 1 gr/kg, XOS 0.5 gr/kg, diabetic control, and non-diabetic control. Animals were given the test substances and standard feed for 2 weeks then induced with STZ (streptozotocin) except for non-diabetic control. On the 19th day, the data was collected. The results showed that XOS 2 gr/kg BW could prevent blood sugar elevation which is 57.84% lower than diabetic control and show a comparable cholesterol level to normal control. It can be concluded that administration of XOS showed a significant effect in preventing T2DM.

Key words: XOS; prebiotic; T2DM

ARTICLE HISTORY

Received: January 2019

Revised: March 2019

Accepted: July 2019

*Corresponding author

Email : lusi_putridwita@uhamka.ac.id

PENDAHULUAN

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) (2016) memperkirakan bahwa jumlah penderita diabetes akan meningkat dari 171 juta pada tahun 2000 menjadi 366 juta pada tahun 2030; terutama di negara-negara berkembang. Diabetes Mellitus Tipe 2 (DMT2), yakni diabetes dengan resistensi insulin dan atau gangguan sekresi insulin, menyumbang 90-95% dari semua kasus diabetes (American Diabetes Association, 2014). Diabetes mellitus tipe 2 termasuk masalah kesehatan yang tinggi di Indonesia (Widyahening et al., 2014). Hasil survey Kementerian Kesehatan Indonesia (RISKESDAS) pada tahun 2007 menemukan bahwa prevalensi diabetes di Indonesia adalah sekitar 6%, jumlah ini setara dengan lebih dari 12 juta penduduk Indonesia.

Kebanyakan pasien DMT2 mengalami obesitas, dan sebaliknya, obesitas juga dapat menyebabkan resistensi insulin. Meskipun beberapa pasien diabetes memiliki berat badan normal, namun terdapat peningkatan lemak tubuh terutama di daerah perut (American Diabetes Association, 2014).

Mikrobiota usus terutama terdiri dari tujuh divisi bakteri, yaitu, *Firmicutes*, *Bacteroides*, *Proteobacteria*, *Fusobacteria*, *Verrucomicrobia*, *Cyanobacteria* dan *Actinobacteria*. *Firmicutes* dan *Bacteroides* adalah spesies yang paling banyak terdapat di usus (Yang et al., 2009). Bakteri usus memainkan peran penting dalam peningkatan imunitas, ekstraksi energi dari makanan, fermentasi serat makanan untuk menghasilkan (*Short Chain Fatty Acid*) SCFA, perubahan metabolisme asam lemak dan glukosa, pengaturan permeabilitas usus,

produksi vitamin dan peningkatan penyerapan mineral pada manusia (Kellow et al., 2014).

Prebiotik merupakan komponen makanan yang tidak tercerna, yang dapat merangsang pertumbuhan mikroorganisme untuk tujuan meningkatkan fungsi pencernaan (Elizabeth et al., 2003). Xilooligosakarida (XOS) telah diteliti sebagai prebiotik yang mampu secara signifikan meningkatkan *bifidobacterial* usus dengan konsumsi relatif rendah (2.8 g per hari) (Slavin, 2013). Hasil penelitian menunjukkan bahwa makanan tinggi lemak dapat meningkatkan lipopolisakarida (LPS) plasma (endotoksemia metabolik), dimana akan berdampak pada peningkatan berat badan, gula darah puasa dan inflamasi. Ini adalah salah satu mekanisme yang menjelaskan hubungan antara mikrobiota usus, regulasi penyimpanan lemak dan perkembangan obesitas serta DMT2 (Lau et al., 2015). Intervensi prebiotik telah terbukti dapat menunda timbulnya penyakit ini. Suplementasi *oligofructose*, yang meningkatkan jumlah *Bifidobacteria*, dapat mengurangi LPS plasma dan sitokin proinflamasi di jaringan adiposa (Cani et al., 2007). Penelitian lain juga menunjukkan bahwa suplementasi prebiotik selama 5 minggu bisa menurunkan kadar HbA1c dan LPS plasma secara signifikan pada pasien DMT2 (Kellow et al., 2014). Hasil penelitian menunjukkan hewan yang diinduksi obesitas dan DMT2 mengalami penurunan *Bifidobacteria* dan peningkatan *bilophila* secara signifikan (Everard et al., 2011). Pengembangan prebiotik dari sumber daya alam untuk menunjang kesehatan pasien DMT2 masih belum cukup berkembang di Indonesia. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan dilakukan uji potensi prebiotik XOS untuk mencegah diabetes mellitus tipe 2.

METODE

Alat dan Bahan Penelitian

Streptozotocin (STZ) (P.T Praglas Jaya), Xilooligosakarida (XOS) (Henan Heagreen, Zhoukou, China), dan ketamin. Alat-alat yang digunakan pada penelitian ini antara lain adalah kandang hewan uji yang dilengkapi tempat pakan dan minum, timbangan hewan, timbangan analitik, sonde oral, labu ukur, mikropipet *Eppendorf*, *microtube*, tip, vortex.

19

Hewan Uji

Hewan yang digunakan dalam percobaan yaitu tikus putih (*Ratus norvegicus*) strain *Sprague Dawley*. Tikus yang digunakan berumur 2-3 bulan sebanyak 25 ekor yang dibagi menjadi 5 kelompok yang masing-masing kelompok terdiri dari 5 ekor dengan berat badan tikus 200 - 250 g. Sebelum perlakuan tikus diaklimatisasi terlebih dahulu pada kandang suhu $23 \pm 1^\circ\text{C}$ dengan siklus gelap/terang 12 jam selama 7 hari agar hewan percobaan dapat beradaptasi dengan lingkungan yang baru dan untuk

mencukupkan bobot hewan percobaan dengan diberi minum dan pakan standar secukupnya.

23

Perlakuan terhadap Hewan Uji

Tikus sebanyak 25 ekor dibagi menjadi 5 kelompok, kelompok 1 (kontrol non-diabetes), kelompok 2 (XOS 2g/kg), kelompok 3 (XOS 1g/kg), kelompok 4 (XOS 0.5 g/kg), kelompok 5 (kontrol diabetes). Kelompok 2,3,4 diberikan pakan standar dan XOS (terlarut dalam aquades) p.o selama 2 minggu, sedangkan kelompok 1 dan 5 hanya diberi pakan standar. Hari ke 14, tikus diinduksi menggunakan STZ dalam dapar sitrat 0.1 M (pH=4) (40 mg/ kg, i.p) (Gauthier, 2014). Lima hari setelah injeksi STZ, dilakukan pengukuran kadar gula darah dan kolesterol total (Majd, et al. 2018).

Metode Pengambilan Darah dan Serum Darah

Sebelum dilakukan pengambilan darah, tikus dipuasakan selama ± 16 jam. Tikus dianastesi dengan ketamin i.p 60 mg/kg BB, hingga tak sadarkan diri, kemudian dilakukan pengambilan darah melalui sinur orbital. Darah di ambil 2 ml dalam *microtube* dan di sentrifugasi pada 4000 rpm selama 15 menit untuk memperoleh serum (Vogel, 2008).

Pengukuran Kadar Glukosa Darah

Serum darah diambil dengan menggunakan mikro pipet sebanyak 10 μl dan ditambahkan 1000 μl reagen kit glukosa. Kemudian divorteks ± 1 menit hingga homogen dan inkubasi selama 5 menit pada suhu 37°C . Pengukuran kadar glukosa darah dilakukan menggunakan spektrofotometer klinikal.

Pengukuran kadar kolesterol total

Serum darah diambil dengan menggunakan mikro pipet sebanyak 10 μl dan ditambahkan 1000 μl reagen kit kolesterol. Kemudian divorteks ± 1 menit dan inkubasi selama 15 menit pada suhu 37°C . Pengukuran kadar kolesterol total dilakukan menggunakan spektrofotometer klinikal.

Analisa Data

Analisis data dilakukan menggunakan metode One-way ANOVA dilanjutkan dengan uji Tukey.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyebab diabetes mellitus tipe 2 (DMT2) pada dasarnya karena ketidakseimbangan nutrisi yang dikonsumsi oleh seseorang, kelebihan kalori dan lemak dalam jangka panjang dan kurangnya serat. Ketidakseimbangan diet ini bisa mengakibatkan disbiosis, yang ditandai dengan perubahan dalam komposisi mikrobiota, perubahan aktivitas metabolisme bakteri dan/atau perubahan distribusi mikrobiota usus (Delzenne et al., 2013). Salah satu cara mencegah DMT2 adalah dengan pendekatan gizi. Suplementasi prebiotik yang bermanfaat

24
Tabel 1. Kadar glukosa darah

Kelompok	Kadar Glukosa Darah (mg/dL)	Penurunan (%)
XOS 2 gr/kg	179.75 ± 15.62 ^{ab}	57.84
XOS 1 gr/kg	247.86 ± 12.45 ^{ab}	41.86
XOS 0.5 gr/kg	366.86 ± 5.38 ^{ab}	13.95
Kontrol non-diabetes	132 ± 7.16 ^a	-
Kontrol diabetes	426.33 ± 7.04 ^b	-

^aberbeda bermakna dengan kontrol diabetes (P< 0,05),

^bberbeda bermakna terhadap kontrol non-diabetes (P< 0,05)

Table 2. Berat badan hewan uji selama pemberian prebiotik

Kelompok	Berat badan tikus (gr) Hari ke-						
	2	4	6	8	10	12	14
XOS 2 gr/kg	183.25	189.63	193.5	186.38*	195.75	199.13*	199.63*
XOS 1 gr/kg	197.63	203.75	210.5	207.13	210.38	213.38	214.38
XOS 0.5 gr/kg	182.75	190.13	193	197	196.75	201	201.75
Kontrol non-diabetes	208.2	214.6	221.4	224.2	229.4	232	237.2
Kontrol diabetes	203.2	221.8	235	240	244.4	251.2	250.6

*berbeda bermakna dengan kontrol diabetes (P< 0,05)

merangsang pertumbuhan mikrobiota usus diketahui memiliki efek yang menguntungkan bagi kesehatan dan berdampak positif pada kondisi DMT2.

Penelitian menunjukkan pada pasien DMT2 terjadi peningkatan bakteri patogen oportunistik, seperti *Bacteroides caccae*, *Clostridium hathewayi*, *Clostridium ramosum*, *Clostridium symbiosum*, *Eggerthella lenta* dan *Escherichia coli*, serta terjadi penurunan beberapa jenis bakteri penghasil butirrat (*Lactobacillus* dan *bifidobacter*) (Lau et al., 2015). Salah satu upaya peningkatan proliferasi mikroorganisme produsen butirrat adalah melalui pemberian prebiotik, yang telah banyak diketahui memiliki efek positif terhadap kesehatan dan berdampak baik pada fungsi gastrointestinal (Kellow et al., 2014; Devaraj et al., 2013).

Pada penelitian ini lakukan pemberian prebiotik XOS (Xilooligosakarida) pada hewan uji selama dua minggu sebelum dilakukan induksi diabetes menggunakan STZ (Streptozotocin). STZ telah diketahui dapat menyebabkan DMT2 cara memasuki sel β pankreas melalui transporter glukosa (GLUT2). STZ menyebabkan alkilasi DNA, pembentukan radikal superoksida dan penghambatan superoksida dismutase (Gauthier, 2014). Hasil pada Tabel 1 menunjukkan pemberian XOS dapat mencegah peningkatan gula darah pada hewan yang diinduksi STZ. Kelompok yang diberikan XOS 2 gr/kg bb dapat mencegah kenaikan gula darah tertinggi yaitu 57.84 % lebih rendah dibandingkan kontrol diabetes, diikuti oleh kelompok XOS 1 gr/kg dan 0.5 gr/kg. Meskipun demikian

pemberian XOS selama dua minggu belum dapat mencegah kerusakan beta pankreas secara keseluruhan. Hal ini ditunjukkan dengan kadar gula darah kelompok XOS yang belum sebanding terhadap kontrol normal.

Selama dua minggu pemberian prebiotik XOS, dilakukan pengukuran berat badan hewan seperti pada Tabel 2. Dosis tertinggi XOS menunjukkan efek terhadap berat badan hewan uji. Meskipun juga mengalami peningkatan seperti kelompok lain, namun pemberian XOS dosis 2 gr/kg menunjukkan peningkatan berat badan paling rendah dan berbeda signifikan dibandingkan kontrol.

Pada penelitian ini dilakukan juga pengukuran kadar kolesterol darah hewan uji (Tabel 3). Kadar kolesterol hewan uji yang diberikan XOS menunjukkan perbedaan signifikan (p<0.05) dibandingkan kontrol diabetes. Hal ini menunjukkan pemberian XOS dapat mencegah peningkatan kadar kolesterol hewan. Namun demikian kadar kolesterol hewan uji masih sedikit lebih besar dibandingkan kontrol normal. Dari ketiga kelompok dosis XOS, pemberian XOS 2 gr/kg menunjukkan kadar kolesterol yang sebanding terhadap kontrol normal. Sehingga dapat disimpulkan pemberian XOS pada dosis ini dapat mencegah peningkatan kadar kolesterol pada kondisi resisten insulin. Penelitian yang telah ada menunjukkan pemberian XOS 4g/hari dapat menurunkan glukosa darah, LDL, dan total kolesterol pada pasien DMT2 [12]. Penelitian ini membuktikan pemberian XOS dengan dosis lebih kecil dapat mencegah DMT2.

28
Tabel 3. Kadar kolesterol total darah

Kelompok	Kadar kolesterol total darah (mg/dL)	Penurunan (%)
XOS 2 gr/kg	193.75 ± 6.13 ^a	45.73
XOS 1 gr/kg	243.43 ± 18.53 ^{ab}	31.81
XOS 0.5 gr/kg	306.85 ± 20.44 ^{ab}	14.05
Kontrol non-diabetes	181.2 ± 13.32 ^a	-
Kontrol diabetes	357 ± 15.3 ^b	-

^aberbeda bermakna dengan kontrol diabetes (P< 0,05).

^bberbeda bermakna terhadap kontrol non-diabetes (P< 0,05)

KESIMPULAN

Pemberian xilooligosakarida selama dua minggu pada tikus secara signifikan dapat mencegah diabetes mellitus tipe 2 akibat induksi streptozotisin.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kami sampaikan kepada Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lemlitbang) Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, Jakarta, yang telah membiayai penelitian ini.

DAFTAR ACUAN

American Diabetes Association. (2014). Diagnosis and classification of diabetes mellitus. *Diabetes Care*, 37(January), 81–90. <https://doi.org/10.2337/dc14-S081>

1 Cani, P. D., Neyrinck, A. M., Fava, F., Knauf, C., Burcelin, R. G., Tuohy, K. M., Delzenne, N. M. (2007). Selective increases of bifidobacteria in gut microflora improve high-fat-diet-induced diabetes in mice through a mechanism associated with endotoxaemia. *Diabetologia*, 50(11), 2374–2383. <https://doi.org/10.1007/s00125-007-0791-0>

14 Delzenne, N. M., Neyrinck, A. M., & Cani, P. D. (2013). Gut microbiota and metabolic disorders : how prebiotic can work ?. *British Journal of Nutrition*. <https://doi.org/10.1017/S0007114512004047>

5 Devaraj, S., Hemarajata, P., & Versalovic, J. (2013). The human gut microbiome and body metabolism: Implications for obesity and diabetes. *Clinical Chemistry*, 59(4), 617–628. <https://doi.org/10.1373/clinchem.2012.187617>

6 Elizabeth, A., Loo, J. Van, & George, C. (2003). Nutritional responses to the presence of inulin and oligofructose in the Diets of Domesticated Animal: A Review. *Critical Reviews in Food Science and Nutrition*, 43(1), 19–60.

2 Everard, A., Lazarevic, V., Derrien, M., Girard, M., Muccioli, G. G., Neyrinck, A. M., ... Cani, P. D. (2011). Responses of Gut Microbiota and Glucose and Lipid Metabolism to Prebiotics in Genetic Obese and Diet-Induced Leptin-Resistant Mice, 60(November), 2775–2786. <https://doi.org/10.2337/db11-0227>

21 Gauthier, E. L. (2014). *Streptozotocin Uses, Mechanism of Action, and Side Effects*. (E. L. Gauthier, Ed.). New York: Nova Science Publishers, Inc.

3 Kellow, N. J., Coughlan, M. T., & Reid, C. M. (2014). Systematic Review Metabolic benefits of dietary prebiotics in human subjects : a systematic review of randomised controlled trials, 1147– 1161. <https://doi.org/10.1017/S0007114513003607>

11 Lau, E., Carvalho, D., Pina-vaz, C., Barbosa, J., & Freitas, P. (2015). Beyond gut microbiota : understanding obesity and type 2 diabetes, 14(3), 358–369.

Majd, N. E., Tabandeh, M. R., Shahriari, A., & Soleimani, Z. (2018). Okra (*Abelmoschus esculentus*) Improved Islets Structure, and Down-Regulated PPARs Gene Expression in Pancreas of High- Fat Diet and Streptozotocin-Induced Diabetic Rats. *Cell Journal*, 20(1), 31–40. <https://doi.org/10.22074/cellj.2018.4819>

15 Slavin, J. (2013). Fiber and Prebiotics: Mechanisms and Health Benefits, 1417–1435. <https://doi.org/10.3390/nu5041417>

4 Widyahening, I. S., Graaf, Y. Van Der, Soewondo, P., & Glasziou, P. (2014). Awareness , agreement, adoption and adherence to type 2 diabetes mellitus guidelines : a survey of Indonesian primary care physicians, 1–8.

10 Yang, X., Xie, L., Li, Y., & Wei, C. (2009). More than 9,000,000 unique genes in human gut bacterial community: Estimating gene numbers inside a human body. *PLoS ONE*, 4(6). <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0006074>

Efek Xilooligosakarida (XOS) dalam Mencegah Diabetes Mellitus Tipe 2

ORIGINALITY REPORT

23%

SIMILARITY INDEX

21%

INTERNET SOURCES

14%

PUBLICATIONS

9%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

- 1 Livia Bordalo Tonucci, Karina Maria Olbrich Dos Santos, Celia Lucia De Luces Fortes Ferreira, Sonia Machado Rocha Ribeiro et al. "Gut microbiota and probiotics: Focus on diabetes mellitus", Critical Reviews in Food Science and Nutrition, 2015
Publication 1%
- 2 Microbiology Monographs, 2015.
Publication 1%
- 3 e-journal.unair.ac.id
Internet Source 1%
- 4 Submitted to University of Dundee
Student Paper 1%
- 5 Submitted to University of Westminster
Student Paper 1%
- 6 www.llu.lv
Internet Source 1%
- 7 www.researchsquare.com
Internet Source 1%

8	Christesa Y. Palawe, Carla F. Kairupan, Poppy M. Lintong. "Efek Hepatoprotektif Tanaman Obat", Medical Scope Journal, 2021 Publication	1 %
9	Submitted to Universitas Indonesia Student Paper	1 %
10	vangrimdecorpssecrets.com Internet Source	1 %
11	hrcak.srce.hr Internet Source	1 %
12	www.hormones.gr Internet Source	1 %
13	docobook.com Internet Source	1 %
14	Jorge Lourenço. "Influência da flora intestinal na etiopatogenia e terapêutica da Diabetes", Repositório Aberto da Universidade do Porto, 2014. Publication	1 %
15	cursos.ufrrj.br Internet Source	1 %
16	media.neliti.com Internet Source	1 %
17	repository.usu.ac.id Internet Source	1 %

18	scholar.unand.ac.id Internet Source	1 %
19	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	1 %
20	nyaspubs.onlinelibrary.wiley.com Internet Source	1 %
21	Submitted to Universitas Riau Student Paper	<1 %
22	jurnal.ugm.ac.id Internet Source	<1 %
23	ppjp.ulm.ac.id Internet Source	<1 %
24	Roza Linda, Indah Lestari, Sri Wahyuni Gayatri, Aryanti Bamahry, Rasfayanah F. Matto. "Pengaruh Ekstrak Daun Salam (<i>Eugenia polyantha</i>) terhadap Kadar Glukosa Darah pada Mencit (<i>Mus Musculus</i>)", UMI Medical Journal, 2020 Publication	<1 %
25	ejournal.upi.edu Internet Source	<1 %
26	tede.universidedefranciscana.edu.br:8080 Internet Source	<1 %
27	Ika Buana Januarti. "Stimulantia Effect Of Single Bulb Garlic Extract (<i>Allium Sativum</i>	<1 %

Var.Solo Garlic) in Swiss Webster Mice", Jurnal Farmasi Indonesia, 2020

Publication

28

Ayu Ulfiah, Arina F Arifin, Rezky Pratiwi, Sri Wahyuni Gayatri, Nesyana Nurmadilla.
"Efektifitas Pemberian Ekstrak Daun Kelor terhadap Kadar Kolesterol Darah pada Hewan Coba Mencit", UMI Medical Journal, 2020

Publication

<1 %

29

eprints.lib.hokudai.ac.jp

Internet Source

<1 %

30

id.forensicsciencetechniciandegree.com

Internet Source

<1 %

31

ononias.wordpress.com

Internet Source

<1 %

32

repository.unika.ac.id

Internet Source

<1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography On